

5% Sodium Fluoride Varnish for the treatment of dentinal hypersensitivity



PROFISIL® FLUORIDE VARNISH

INSTRUCTIONS FOR USE Gebrauchsinformation / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Инструкция по использованию / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso / Kullanım Kilavuzu / Instruções de uso / Instrukcja użycia / Інструкція з застосування / 取扱説明書 / معلومات الاستعمال

For dental professional use only.
Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Manufacturer: Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Germany

Distributed in the U.S. by:
Kettenbach LP
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749
USA

CE 0123
37472/2324
Made in Germany
www.kettenbach.com

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Profisil® Fluoride Varnish hält über mehrere Stunden sicher an der Zahnoberfläche und setzt dabei Fluoridionen frei. Der Lack enthält 5 % Natriumfluorid in einem schleimhautfreundlichen Dimeticongel mit angenehmem Geschmack. Der Lack ist in den Varianten Minze, Beere und geschmacksneutral erhältlich.

Anwendungsgebiete

Profisil® Fluoride Varnish ist ein 5 % Fluoridlack, der bei der Behandlung von hypersensiblen Zähnen einen mechanischen Verschluss der Dentinkanächen indiziert.

Patientenzielgruppe

Patienten, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Potentielle allergene Stoffe

Naturliche und künstliche Beerenaroma.

Kontraindikationen

Ulzerierende Zahnfleischt- oder Mundschleimhautzündungen.

Dieses Produkt nicht bei Personen mit bekannter Fluoridverträglichkeit verwenden. Bei Anzeichen einer Entzündung oder allergischer Reaktion die Verwendung sofort abbrechen und das Produkt bei diesem Patienten nicht weiter verwenden.

Warnhinweise

Allergische Reaktionen auf das Produkt können bei sensiblen Personen nicht ausgeschlossen werden. Eine Sensibilisierung durch Kontakt mit der Haut / den Schleimhäuten ist möglich.

Vorsichtsmaßnahmen

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums verwenden.

Inhalern von 24 Stunden nach Anwendung des Lacks dürfen keine anderen fluoridhaltigen Produkte verwendet werden.

Angemessene Schutzmaßnahmen erfordern (z.B. Handschuh und Schutzbürste tragen).

Augenkontakt vermeiden. Bei verletzlichem Augenkontakt: Sofort gründliches Ausspülen mit Augendusche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Kontakt mit Kleidung vermeiden, da eine dauerhafte Schädigung von Bekleidung nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Komponenten sind aus hygienischen Gründen für den Einmalgebrauch bestimmt.

Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.kettenbach.de.

Allgemeine Hinweise

Profisil® Fluoride Varnish kann auf alle Zahnoberflächen aufgetragen werden, auch auf schwierig zu erreichende Bereiche. Vor der Anwendung ist keine prophylaktische Reinigung erforderlich. Wird eine prophylaktische Reinigung durchgeführt, den Lack nach dem Scaling und Polieren auftragen. Die Zähne müssen vor dem Auftragen des Lacks nicht getrocknet werden.

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch sicherstellen, dass die Verseiegelung der Verpackungsfolie intakt ist.

Die Folie des Einzelblister vorsichtig abziehen. Die Folie in der Nähe der Bürste anheben und die Bürste entnehmen. Die übrige Folie abziehen und den Lack freilegen.

Vor der Anwendung den Inhalt mit dem borstenlosen Ende der beiliegenden Applikatorbürste vermischen, bis eine homogene Masse entstanden ist. Die Bestandteile des Lacks können sich bei längerer Lagerung unten in der Verpackung abscheiden.

Mit der beiliegenden Applikatorbürste eine dünne, gleichmäßige Schicht auf alle betroffenen Zahnoberflächen auftragen.

Der Einzelblister enthält ausreichend Lack für die Behandlung aller betroffenen Zähne des Ober- und Unterkiefers. Direkt nach der Anwendung nicht ausspülen lassen oder absaugen.

Nach Anwendung des Lacks den Patienten anzeigen, mindestens vier Stunden lang nicht die Zähne zu putzen und keine Zahnsseide zu verwenden sowie auf heiße Getränke oder alkoholhaltige Produkte (z. B. Getränke, Mundspülungen usw.) zu verzichten und nur bei Bedarf weiche Lebensmittel zu verzehren.

Profisil® Fluoride Varnish sollte alle sechs Monate oder nach Empfehlung des Arztes aufgetragen werden.

Informationen für den Patienten

Heute wurde ein Lack mit 5 % Natriumfluorid auf Ihre Zähne aufgetragen. Diese Behandlung schafft auf sichere Weise eine Schutzschicht für Ihre Zahnoberflächen. Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, beachten Sie nach Verlassen unserer Praxis bitte die folgenden Empfehlungen:

Putzen Sie mindestens vier Stunden lang die Zahnsseide. Warten Sie falls möglich bis zum nächsten Morgen, bevor Sie Ihre normale Mundhygiene wieder aufnehmen.

Vermeiden Sie mindestens vier Stunden lang heiße Getränke und alkoholhaltige Produkte (z. B. Getränke, Mundspülungen usw.) und essen Sie nur bei Bedarf weiche Lebensmittel.

Reinigung und Desinfektion

Die Komponenten des Profisil® Fluoride Varnish sind aus hygienischen Gründen für den Einmalgebrauch bestimmt.

Lagerungsbedingungen

Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Das Produkt bei 10°C / 50°F – 25°C / 77°F aufbewahren.

Zusammensetzung

Polydimethylsiloxane, 5 % Natriumfluorid, entsprechend 22,6 mg / g Fluoridionen, Stevia*, Xylitol*, filmbildendes organisches Polymer, Aroma*, „niet enthalten in der Variante „unflavored““

Bei der Produktion des Profisil® Fluoride Varnish werden keine Produkte verwendet, die Gluten, Erdnüsse, Nüsse, Soja, Sesam, Mais, Schalenfrüchte, Eier oder Milchprodukte enthalten.

Entsorgung

Die leere Blisterfolie und die Bürsten entsprechen den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Updated: July 1, 2024

INSTRUCTIONS FOR USE Gebrauchsinformation / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Инструкция по использованию / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso / Kullanım Kilavuzu / Instruções de uso / Instrukcja użycia / Інструкція з застосування / 取扱説明書 / معلومات الاستعمال

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

For dental professional use only.

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Después de aplicar el barniz indica al paciente que no debe cepillarse los dientes ni usar hilo dental, y que debe evitar las bebidas calientes y los productos con alcohol (p. ej., bebidas alcohólicas, enjuagues bucales, etc.). Además, durante las primeras cuatro horas solo puede tomar alimentos blandos.

Profisil® Fluoride Varnish debe aplicarse cada seis meses o según lo recomienda el médico.

Información para el paciente
Hoy le han aplicado un barniz de fluoruro sódico al 5% en los dientes. Este tratamiento proporciona un recubrimiento protector a la superficie de los dientes. Para conseguir el máximo beneficio, le rogamos que siga las recomendaciones siguientes cuando salga de la clínica:

No se cepillen los dientes ni use hilo dental durante las próximas cuatro horas. Si es posible, espere hasta mañana para retomar su rutina de higiene bucal.

Evite beber bebidas calientes y productos con alcohol (p. ej., bebidas alcohólicas, enjuagues bucales, etc.). Además, durante las primeras cuatro horas solo puede tomar alimentos blandos.

Limpieza y desinfección
Los componentes de Profisil® Fluoride Varnish son desechables.

Almacenamiento
Guardar en un lugar seco protegido de la luz del sol.

El producto debe almacenarse entre 10°C/50°F–25°C/77°F.

Composición
Polidimetilsiloxano, fluoruro sódico al 5% equivalente a 22,6 mg/g de iones de fluoruro, estévia*, xilitol*, polímero orgánico formador de capa, sabor... *no incluido en la versión „unflavored”

Profisil® Fluoride Varnish no está elaborada con productos que contengan gluten, cacahuete, frutos secos, soja, sésamo, maíz, moluscos, huevo o lácteos.

Eliminación
Los blisteres y los pinceles deben desecharse conforme a las normas legales vigentes en cada país.

Marcas comerciales
Profisil® es una marca comercial registrada de Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota
Algunos materiales Kettenbach sólo se comercializan en países determinados.

Uso exclusivo por personal dental especializado.

En caso de que se produzcan complicaciones relacionadas con el producto, contacte de inmediato con el fabricante y con las autoridades competentes.

Limitación de responsabilidad
En la medida en que sea legalmente admisible la exclusión de la responsabilidad, la Kettenbach GmbH & Co. KG no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas o los daños causados por este producto, no importando si se trata de daños directos, indirectos, especiales, colaterales o consecuenciales e independientemente del fundamento legal, incluyendo garantía, contrato, negligencia o culpa intencional.

Las indicaciones referentes a los productos Kettenbach se basan en una extensa investigación y experiencia en las técnicas de aplicación. Transcurridos más de 24 meses desde la fecha de producción, se recomienda revalidar las indicaciones de aplicación. Transcurridos más de 24 meses desde la fecha de producción, se recomienda revalidar las indicaciones antes de su aplicación.

Actualización: 1 de julio de 2023

TÜRKÇE

Ürün tanımı
Profisil® Fluoride Varnish birkaç saat boyunca diş yüzeyine güvenli bir şekilde yapışır ve bu arada florur iyonları serbest bırakır. Vernik, hırsız taraflı, mukozda doğrudan tüketim için 5% sodiyum florur içerir. Vernığın nane, meyve ve not aromaları versiyonları mevcuttur.

Uygulama alanları
Profisil® Fluoride Varnish her zaman dişlerin tedavisi devamlı olarak kullanılmamalıdır. Enflamasyon veya alerjik reaksiyon belirtileri ortaya çıkarırsa, kullanımın代替 olarak hırsız taraflı veya 5% florur içeren dişlere geçilebilir.

Hasta yardım grubu
Diş hekiminden tarafından bir önlisans kapsamında tedavi edilen hastalar.

Olası alerjen maddeleri
Doğal ve yaygın aromalar.

Kontrendikasyonlar
Diş etiende veya ağız mukozasında ulerterif enflamasyon.

Bu ürün, florur intoleransı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Enflamasyon veya alerjik reaksiyon belirtileri ortaya çıkarırsa, kullanımın代替 olarak hırsız taraflı veya 5% florur içeren dişlere geçilebilir.

Uyarılar
Hassas kişilerde jürüm karşı alerjik reaksiyonların ortaya çıkma olasılığı göz ardı edilemez. Deriye/mukoza zararları temas yoluyla hassasiyet ortamınıza neden olabilir.

Güvenlik önlemleri
Cocukları erişimeyeceğinde saklayın.
Son kullanım tarihinden sonra kullanmayın.

Vernığın uygulamasından sonraki 24 saat içinde florur içeren başka bir ürün kullanılamaz.

Uygun korucuların ortamda kalanlarla temas etmesini engelleyin.

Bileşenler hırsız nedenden ötürü tek kullanımlık.

Güvenlik uyaruları
Güvenlik uyaruları www.kettenbach.com adresinde bulabilirsiniz.

Genel notlar
Profisil® Fluoride Varnish 5% diş yüzeylerine, hatta ulaşılması zarlanlar bile uygulanabilir. Uygulamadan önce profilaktik temizlik gereklidir. Profilaktik temizlik yapılırsa verniği dışına dökerme ve polisaj sonrasında uygulanır. Verniği uygulamadan önce dişleri kurutmanız gereklidir.

Kullanım tarihimiz
Kullanıldan önce ambalaj floruksiyonu sağlanmalıdır. Elifoxiyonlu floruksiyonlu ambalaj floruksiyonu sağlanmalıdır.

Folyo tıpkı blisterlerde olduğu gibi çökrek. Folyo tıpkı yanından yukarı kaldırın ve fırçayı çıkarın. Kalan folyo çökrek çıkarın ve verniği ortaya çıkarın.

Uygulamadan önce içindeleri, bireklik verilen aplikatör fırçalarının kılıfı ucuyla hemen bir kürle olusanak kadar karıştırın. Uzun süreli saklama durumunda verniği bilesenler ambalajın alt kısmına koysın.

Bireklik verilen aplikatör fırçalarının kılıfı tıpkı yüzeylerine hemen bir kürle halinde uygulanır.

Tek dozlu blister, ıstır atımlıda ilk tıpkı dilediye uygulayın ve tekerlek kılafı vernik içeriği. Uygulamadan hermen sonra duralımaya veya aspire etmeye.

Verniği uyguladıktan sonra hastaya, en az 5 saat boyunca dişlerini fırçalamaması veya diş içi kullanımaması, sık sık içmekle veya alkıl içenlerden (örneğin içecekler, gargaralar vb.) kaçaması ve yalnızca gerektiğiinde yumuşak yiyeceler tüketmesini söyleyin.

Profisil® Fluoride Varnish altı ayda bir veya doktorun önerdiği sıklıkla uygulanmalıdır.

Hasta için bilgiler
Bugün dişlerine 5% sodiyum florur içeren bir vernik uygulandı. Bu tedavi diş yüzeylerinde güvenli bir şekilde koruyucu bir tabaka oluşturur. Mükemmən olan en iyi sonucu elde etmek için lütfen muayenehanemizden ayrıldıktan sonra aşağıdaki önerilere dikkat edin:

En az saat boyunca dişlerini fırçalamamın veya diş içi kullanımının devam etmesinden önce ertesi sabaha kadar bekleyin.

Mükemmən normal ağız hırsızlığını devam etmeden önce ertesi sabaha kadar bekleyin.

En az saat boyunca sıkı içeceklerden (örneğin içecekler, gargaralar vb.) kaçaması ve yalnızca gerektiğiinde yumuşak yiyeceler tüketin.

Temizlik ve dezenfeksiyon
Profisil® Fluoride Varnish bilesenleri, hırsız nedenden ötürü tek kullanımlık.

Saklama koşulları
Kuru bir ortamda ve 10°C/50°F–25°C/77°F sıcaklıkta saklayın.

Kuru bir ortamda ve 10°C/50°F–25°C/77°F